

# Назначение риоцигуата в рамках монотерапии преследует наибольшее количество терапевтических целей

CHEST 2019

## Препараты\* для лечения «наивных» пациентов с ЛАГ II ФК по ВОЗ

	РИОЦИГУАТ	СИЛДЕНАФИЛ	МАЦИТЕНТАН	БОЗЕНТАН	АМБРИЗЕНТАН
Улучшение ДбМХ	✓	✓			✓
Улучшение ФК по ВОЗ	✓				
Увеличение времени до клинического ухудшения	✓		✓	✓	

## Препараты\* для лечения «наивных» пациентов с ЛАГ III ФК по ВОЗ

	РИОЦИГУАТ	СИЛДЕНАФИЛ	МАЦИТЕНТАН	БОЗЕНТАН	АМБРИЗЕНТАН
Улучшение ДбМХ	✓	✓		✓	✓
Улучшение ФК по ВОЗ	✓	✓	✓		
Увеличение времени до клинического ухудшения	✓		✓		
Уменьшение госпитализаций, связанных с ЛАГ в краткосрочной перспективе				✓	

\*Приведены препараты, зарегистрированные на территории РФ (<https://grls.rosminzdrav.ru>; по состоянию на 29 июля 2021 г.)

Авторы рекомендаций пришли к заключению об отсутствии достаточных доказательств для формулирования рекомендаций «за» или «против» применения селекспага

