

ФИКСИРОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ¹⁻⁷:

- ✓ Повышение эффективности и более быстрое достижение целевого АД¹
- ✓ Уменьшение количества побочных эффектов¹
- ✓ Повышение приверженности пациентов лечению^{1-3, 6}

1-Й ШАГ ТЕРАПИИ¹

Семья фиксированных комбинаций с индапамидом Сервье:

2-Й ШАГ ТЕРАПИИ¹

Нолипрел® А форте



САД > 140 мм рт. ст.

- ✓ Высокая солевосчувствительность¹⁴
- ✓ Избыточная масса тела¹⁵

ПЕРИНДОПРИЛ

ИНДАПАМИД
СЕРВЬЕ
создан
для лечения
АГ**

ПЕРИНДОПРИЛ

ТРИПЛИКСАМ®



Для пациентов, не достигших контроля АД на предшествующей комбинированной терапии⁹

АРИФАМ®



Высокое пульсовое давление (ПАД*) ≥ 60 мм рт. ст. и риск инсульта¹¹⁻¹³

* ПАД - это разница между систолическим и диастолическим АД (САД и ДАД)

АМЛОДИПИН

АМЛОДИПИН

ВСЕГДА
1 таблетка
в день

** АГ - Артериальная гипертензия

1. Manca G., Fagard R., Narkiewicz K., Redon J., Zanchetti A., Buhr M. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013; 34: 2159-219. 2. Al-Ganmi A. H., Perry L., Gholizadeh L., Alotaibi A. M. Cardiovascular medication adherence among patients with cardiac disease: a systematic review. J Adv Nurs. 2016; 72: 3001-14. 3. Yang W., Chang J., Kahler K. H., Fellers T., Orloff J., Wu E. Q. et al. Evaluation of compliance and health care utilization in patients treated with single pill vs. free combination antihypertensives. Curr Med Res Opin. 2010; 26: 2065-76. 4. Manca G., Rea F., Cuspidi C., Grassi G., Corrao G. Blood pressure control in hypertension. Pros and cons. S. Corrao G., Parodi A., Nicotra F., Zambon A., Merlino L., Cesana G. et al. Better compliance to antihypertensive medications reduces cardiovascular risk. J Hypertens. 2011; 29: 610-8. 6. Williams B., Manca G. et al. ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018; 39: 3021-3104. 7. Кобалава Ж. Д., Троицкая Е. А., Толкачёва В. В. Организация и основные результаты программы «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». Кардиология, 2018; 58 (9): 21-30. 8. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Нолипрел® А Би-форте. РУ ЛСР-008847 от 30.08.2010. 9. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Трипликсам®. РУ ЛП-003905 от 17.10.2016 (переоформлено 05.12.2018). 10. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Арифам®. РУ ЛП-004188 от 15.03.2017. 11. Кобалава Ж. Д. с соавт. Эффективность и переносимость Арифам у пациентов с артериальной гипертензией старше 55 лет: основные результаты наблюдательной программы АРБАЛЕТ. Российский кардиологический журнал. 2018; 23(12). 12. Beckett N. et al. HYVET Study Group. N. Engl. J. Med 2008; 13. Wang J. et al. Hypertension. 2007; 50:181-188. 14. Weinberger M.H. Salt sensitivity of blood pressure in humans. Hypertens. 1996; 27(3):481-490. 15. De'zsi CA, Glezer M, Villatte R, Karpov Y, Farsang C. Effectiveness of perindopril/indapamide single-pill combination in uncontrolled hypertensive patients: a combined analysis of FORTISSIMO, FORSAGE, ACES and PICASSO observational studies. J. Hypertens. 2018; 36(e-Suppl 3):202.